

١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دوله فلسطين  
وزاره التربية والتعليم

# الرياضيات

## الفترة الثانية



mohe.ps  | mohe.pna.ps  | mohe.gov.ps 

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

فاسخ  +970-2-2983250 | هاتف  +970-2-2983280

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pedc.mohe@gmail.com  | pedc.edu.ps 

# المحتويات

٣	الدرس الأول: الأسس واللوغاريتمات
٩	الدرس الثاني: الاقتران الأسّي
١٣	الدرس الثالث: الاقتران اللوغاريتمي
١٨	الدرس الرابع: الارتباط الخطّي
٢٠	الدرس الخامس: معامل ارتباط بيرسون
٢٣	الدرس السادس: معامل ارتباط سبيرمان
٢٦	الدرس السابع: الانحدار الخطّي البسيط
٢٩	الدرس الثامن: مبدأ العدّ
٣١	الدرس التاسع: التباديل
٣٣	الدرس العاشر: التوافق
٣٤	الدرس الحادي عشر: نظرية ذات الحدين
٣٦	ورقة عمل
٤٠	اختبار ذاتي

- يتوقع من الطلبة بعد الإنتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع أنشطتها أن يكونوا قادرين على توظيف الاقترانات الأسّية واللوغاريتمية والارتباط ونظرية ذات الحدين في الحياة العملية من خلال الآتي:
- رسم شكل الانتشار الذي يمثل العلاقة بين متغيريْن.
  - استنتاج قوانين اللوغاريتمات.
  - إيجاد معامل ارتباط بيرسون.
  - حلّ معادلاتأسّية أو لوغاريمية.
  - تمثيل الاقترانات الأسّية بيانياً.
  - استنتاج خصائص الاقتران الأسّي.
  - تمثيل الاقتران اللوغاريتمي بيانياً.
  - استنتاج خصائص الاقتران اللوغاريتمي.
  - توظيف التحويلات الهندسية المختلفة في رسم الاقترانات اللوغاريتمية والأسّية.
  - استنتاج العلاقة بين الاقترانين الأسّي واللوغاريتمي.
- استخدام مبدأ العد في سياقات حياتية.
- حساب التباديل والتوافق الرأية لمجموعة تحتوي ن من العناصر.
- استخدام نظرية ذات الحدين في إيجاد مفوكوك مقدار جبري.

## الأسس واللّوغاريتمات


(١)

أكمل الجدول الآتي:

$10^{-4} \times 10^3$	$\frac{1}{2}$	$75 \div 5^2$	$4^{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{8}^{-3}$	$2^{-3}$	$2^2$	المقدار
					$\frac{1}{9}$	٨	قيمة المقدار



تعريف: إذا كان  $x = a^m$ , حيث  $x \neq 0$ ,  $a \neq 1$ , نسمى  $m$  لوغاريتم العدد  $x$  للأساس  $a$ , ويعبر عنه رياضياً:  $\log_a(x) = m$  (الصورة اللّوغاريتمية)، ويقرأ لوغاريتم  $x$  للأساس  $a$  يساوي  $m$ . المثال الآتي يوضح العلاقة بين الصورة الأُسية، والصورة اللّوغاريتمية:



أكمل الجدول الآتي بما يناسبه:



$1 = 9^{\frac{1}{n}}$	$\frac{1}{81} = 3^{-4}$		$8 = 2^3$	الصورة الأُسية
$\log_10(x) = 4$		$\log_{10}(10000) =$	_____	الصورة اللّوغاريتمية

أُحول الآتي من الصورة الأُسّية إلى الصورة اللوغاريتمية:

- |                           |                       |                  |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ج) $3 = 1$                | ب) $2 = 1^3$          | أ) $3 = 1^2$     |
| و) $2^3 = 8$              | ه) $3^4 = 81$         | د) $5 = 1$       |
| ج) $\log(1) = \text{صفر}$ | _____ = $\log(2) = 1$ | أ) $\log(3) = 1$ |
| د) $\log(2) = 3$          | ه) $\log(1) = 4$      | د) $\log(1) = 4$ |



ماذا تلاحظ؟

أتعلم:  $\log(1) = 0$  ،  $\log(1) = \text{صفر}$  ،  $\log(1) = 0$

أُحدِّد قيمة اللوغاريتمات الآتية:

- |                    |                         |                                       |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| أ) $\log(2) = 0.6$ | ب) $\log(1) = \sqrt{7}$ | ج) $\log\left(\frac{1}{9}\right) = 0$ |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|



أُكمل الجدول الآتي ثم أجيِّب عما يليه:

32	16	8		2	s
5	4	3	2	1	$\log(s)$
	2			$\frac{1}{2}$	$\log(s)$



- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| $3 = 2 + 1 = \log(2) + \log(4)$ | $3 = \log(8) = \log(2 \times 4)$ |
| _____ = $\log(2) + \log(8)$     | _____ = $\log(8 \times 2)$       |
| _____ = $\log(2) + \log(4)$     | _____ = $\log(4 \times 2)$       |
| _____ = $\log(2) + \log(8)$     | _____ = $\log(8 \times 2)$       |

ماذا تلاحظ؟

**أتعلم:** إذا كان  $s$ ،  $ص$  عددين حقيقيين موجبين، وكان  $m$  عدداً حقيقياً موجباً غير الواحد، فإن:  $\log(s \times ص) = \log(s) + \log(ص)$ .

أكمل الجدول الآتي ثم أجيب عما يليه:

	٨١	٢٧		٣	$s$
$٥$			٢	١	$\log(s)$



$$(1) \log\left(\frac{81}{27}\right) = \log(3) - \log(27) = 1 - 3 = 3 - 4 = -1$$

$$(2) \log\left(\frac{243}{9}\right) = \log(9) - \log(243) = 2 - 5 = -3$$

ماذا تلاحظ؟

**أتعلم:** إذا كان  $s$ ،  $ص$  عددين حقيقيين موجبين، وكان  $m$  عدداً حقيقياً موجباً غير الواحد، فإن:  $\log\left(\frac{s}{ص}\right) = \log(s) - \log(ص)$

- إذا كان  $s$  عدد حقيقياً موجباً، فإن:  $\log(s) = m$  لو  $(ص) = m$ ، بحيث  $m \in \mathbb{H}^*$ .



أكتب كل مما يأتي بصورة لوغاريتيم واحد:

$$(1) (\log(8) - \log(ص)) = \log\left(\frac{8}{ص}\right)$$

$$(2) (\log(4) + \log(s)) - (\log(2) + \log(3)) = \log(4s) - \log(6) =$$



إذا كان  $\log(7) = 2,81$  ، أجد قيمة كل مما يأتي:

$$(1) \log(28) \quad (2) \log(7) \quad (3) \log(3,5) \quad (4) \log(2,8)$$

$$1) \log(28) = \log(7 \times 4) = \log(7) + \log(4)$$

$$2) \log(7) = \underline{\quad} \times 3 = \log(7) \times \underline{\quad} =$$

$$3) \underline{\quad} = \log(3,5)$$

$$\underline{\quad} = \log(\underline{\quad}) - \log(\underline{\quad})$$

**مثال:** أحل المعادلة:  $\log(s+2) - \log(s-1) = 2$

$$\text{الحل: } \log(s+2) - \log(s-1) = \log \frac{s+2}{s-1}$$

$$2 = \frac{s+2}{s-1}$$

$$s+4 = 2(s-1)$$

$$s = 4s - 4 - 2 \text{ ، ومنها: } s =$$

**أحل** المعادلة:  $\log(s) + \log(3) = 2$



$$2 = \log(\underline{\quad})$$

$$\underline{\quad} = 10$$

$$\underline{\quad} = 100$$

$$s = \frac{100}{3}$$

## تمارين ومسائل:

(١) أحسب قيمة كل من:

ب)  $\log(81)$

أ)  $\log(64)$

(٢) أحوال من الصورة الأسيّة إلى اللوغاريتميّة:

ب)  $10^x = 0,10$

أ)  $2^x = 16$

(٣) أحوال من الصورة اللوغاريتميّة إلى الصورة الأسيّة:

ب)  $\log(0,001) = -3$

أ)  $\log(1) = 0$

(٤) إذا كان  $\log(7) = 2,81$  ،  $\log(5) = 2,32$  ، أجد قيمة ما يأتي:

ب)  $\log\left(\frac{7}{10}\right)$

أ)  $\log(35)$

(٥) أجد قيمة كل ممّا يأتي:

ب)  $\log(81) - \log(9)$

أ)  $\log\sqrt{32} + \log\sqrt{12}$

(٦) أحل المعادلات الآتية:

ب)  $\log(s^5 - s^3) - \log(s^2 + 1) = 0$

أ)  $\log(s^7) = \log(s^2 + 12)$

## الاقتران الأسّي (Exponential Function)

( ٢ )

تعريف: يُسمى الاقترانُ اقترانًاً أَسْيًّاً إذاً كان على الصورة:  $q(s) = b^s$  ،  $b \neq 1$  ،

$$b > 0, s \in \mathbb{R}$$

لماذا  $b > 0$  ،  $b \neq 1$  ؟

أناقش

أيّ من الاقترانات الآتية اقترانًّاً أَسْيًّاً ؟

الاحظُّ انّ:  $q(s) = s^2$  اقترانًّاً أَسْيًّا؛ لأنّ ..... .

بينما  $h(s) = (3-s)$  ليس اقترانًّاً أَسْيًّا؛ لأنّ الأساس  $3-s > 0$  .

وعليه فإنّ:  $l(s) = s^2$  هو اقترانًّاً .....؛ لأنّ المتغير ليس أَسًا.

$m(s) = \left(\frac{1}{s}\right)$  هو اقترانًّاً .....؛ لأنّ ..... .




أمثلُ الاقتران:  $q(s) = 2^s$  ،  $s \in \mathbb{R}$  في المستوى الديكارتي.

أكملُ الفراغاتِ في الجدول الآتي:

	-٢	-١	٠	١	٢	٣	$s$
	$\frac{1}{8}$		$\frac{1}{2}$	١		٨	$q(s)$

• أعيّنُ النقاطَ من الجدول السابق في المستوى الديكارتي،

وألاحظُ شكل منحنى الاقتران:



- من التمثيل البياني لمنحنى الاقتران، أتعلم أهم خصائص منحنى الاقتران الأسّي هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة (ح+).
- منحنى الاقتران يقطع محور الصادات في النقطة (٠، ٠).
- كلما زادت قيمة س تزداد قيمة ص المُناظِرَةُ لها.

أكمل الجدول الآتي لقيمة س ، والاقتران  $q(s)$  ، ثم أرسم منحنى الاقتران.

٣		١٠		١	٢	٣	س
	٤	٢	١			$\frac{1}{8}$	$q(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$



أعين النقاط على المستوى الديكارتي، وأرسم منحنى الاقتران.

- الاحظ من الرسم أن منحنى  $q(s) = 2^s$  هو انعكاس لمنحنى الاقتران  $h(s) = \left(\frac{1}{2}\right)^s$  في محور الصادات، أوضح ذلك جبرياً.
- من التمثيل البياني للاقتران في النشاط السابق، الاحظ أهم خصائص الاقتران الأسّي:  
 $q(s) = 2^s$  ،  $s > 1$  وهي:

١) مدى الاقتران الأسّي هو: .....

٢) يقطع منحنى الاقتران محور الصادات في النقطة: .....

٣) كلما زادت قيمة س، فإن قيمة ص المُناظِرَةُ لها .....



أكمل الفراغات في الجدول الآتي اذا كان  $q(s) = 2^s + 3^s$  :

$s$	٣	٢	.	٢	٣	$q(s) =$
	$2^{\frac{1}{9}}$	$2^{\frac{1}{3}}$		٥		٢٩

أعين النقاط في الجدول السابق على المستوى الديكارتي، وأرسم منحنى الاقتران.

الاحظ أن: الاقتران  $q(s) = 2^s + 3^s$  هو انسحاب لمنحنى الاقتران  $h(s) = 3^s$  وحدتين إلى الأعلى.

اتعلم: يمكن تطبيق جميع التحويلات الهندسية التي تعلمتها على الاقتران الأسّي.


### الاقتران الأسّي الطبيعي

الاقتران الأسّي الطبيعي: هو اقتران أسّي يكون أساسه العدد  $e$  ، حيث  $e$  عدد غير نسبي له أهمية خاصة في الرياضيات ويسمى العدد النيبيري نسبة إلى (John Napier) ويساوي تقريرياً  $2,71828$



أكمل الجدول الآتي لقيم  $s$  ،  $q(s)$  للاقتران  $q(s) = e^s$  ، باستخدام الآلة الحاسبة، ثم أرسم منحنى الاقتران:

$s$	٣	٢	١	.	٠	$e^s$
					١,٦٥	$7,39$



## تمارين ومسائل:

(١) أي من الاقترانات الآتية يُعد اقتراناً أسيّاً؟ مع بيان السبب.

أ)  $Q(s) = 5s$

ب)  $M(s) = 4s$

ج)  $H(s) = 2s^2$

د)  $C(s) = (2s)$

هـ)  $C(s) = \left(\frac{2}{3}\right)s$

(٢) أمثل منحنى الاقترانات الآتية في المستوى الديكارتي، وأجد مدى كل اقتران منها:

أ)  $C(s) = 2s^3$

ب)  $C(s) = 5s^2$

ج)  $C(s) = 4s^4$

د)  $C(s) = \left(\frac{1}{4}\right)s^4$

## مهمة تعليمية:

(١) استخدم منحنى  $Q(s) = Hs$ ، والتحويلات الهندسية المناسبة لرسم الاقترانات الآتية:

أ)  $Q(s) = Hs$

ب)  $Q(s) = 3 - Hs$

ج)  $Q(s) = H(s)$

(٢) أجد قيمة كل من:  $A$  ،  $B$  لمنحنى  $Q(s) = 4(3s) + B$  ، الذي يمر بال نقطتين:  $(1, 3)$  ،  $(2, 0)$ .

## الاقتران اللوغاريتمي (Logarithmic Function)

( ٣ )

أجد قيمة ما يأتي :

$$\text{لو}_{\frac{1}{4}} \dots = 64$$

$$\text{لو}_{\frac{1}{10}} \dots = 100$$

$$\text{لو}_{\frac{1}{8}} = \dots \quad \text{لو}_{\frac{3}{7}} = \dots \quad \text{لو}_{\frac{1}{49}} = \dots$$

أتعلم: الاقتران على الصورة  $q(s) = \text{لو} s$  ، حيث  $s > 0$  ،  $s \neq 1$  ، حيث  $s > 0$  ،  $s \neq 1$  يسمى اقترانًا لوغاريتمياً.



لماذا  $s > 0$  ،  $s \neq 1$  ؟

أناقش



**ملحوظة:** من اللوغاريتمات الأكثر شيوعاً اللوغاريتم ذو الأساس  $10$ ، ويسمي اللوغاريتم العادي، ويكتب عادةً على الصورة  $s = \text{لو} s$  ، حيث  $s > 0$  (لا يكتب له الأساس  $10$ ). وإذا كان الأساس العدد  $e$  يسمى اللوغاريتم الطبيعي، ويكتب على الصورة:  $q(s) = \text{لو} s$ .


أكون جدولًا لقيم  $s$  ،  $q(s)$  المقابلة لها، للاقتران  $q(s) = \text{لو} s$ ، ثم أرسم منحنى الاقتران.



	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	١		٤	٨	$s$
٣-	٢-			١		٣	$q(s) = \text{لو} s$

$$\text{أذكر أن: } \ln \frac{1}{4} = -2$$

عُين النقاط في المستوى البياني، وأرسم منحنى الاقتران ، كما هو في الشكل (٣-٢) :



- من منحنى الاقتران  $y = e^x$  ، الاحظ خصائص الاقتران  $y = e^x$  ، حيث :
- مجال الاقتران اللوغاريتمي هو: ..... ومداه هو: .....
  - نقطة (أو نقاط) تقاطع منحنى الاقتران مع محوري الإحداثيات هي: .....
  - كلما زادت قيمة  $x$  فإن قيمة  $y$  ص المقابلة لها .....

أرسم منحنى  $y = e^x$  على المستوى المرسوم عليه منحنى الاقتران  $y = e^x$  ثم أقارن بين منحنئي الاقترانين.




أتعلم: بشكل عام، يمكن تطبيق جميع التحويلات الهندسية التي تعلمتها على الاقتران اللوغاريتمي.

مثال (١): بالاعتماد على منحنى الاقتران الأسّي الطبيعي  $y = e^x$  ، وخصائص منحنى الاقتران اللوغاريتمي، أرسم منحنى الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي  $y = e^x$ .



الحل: عرفت من النشاط السابق أن منحنى الاقتران  $y = e^x$  هو انعكاس لمنحنى  $y = e^{-x}$  في المستقيم  $x = 0$ .



نرسم منحنى  $L(s) = هـ$  ، ثم نرسم انعكاسه في الخط المستقيم  $s = هـ$  ، فيكون لدينا منحنى الاقتران ، كما هو في الشكل المجاور.

أجد مجال كل من الاقترانات الآتية:

$$ق(s) = لوـ(s - 3)$$

$$هـ(s) = لوـ(s^2 - 1)$$



مجال الاقتران اللوغاريتمي هو  $هـ > 0$  ، فإن مجال  $ق(s)$  معرفٌ عندما  $s - 3 > 0$  .  
مجال  $ق(s)$  هو ..... .

أما مجال  $هـ(s)$  فهو معرفٌ عندما  $s^2 - 1 > 0$  .

وعليه فإن: مجال  $هـ(s)$  هو : ..... .

## تمارين ومسائل:

(١) مستعيناً بالتحوييلات الهندسية و منحنى الاقتران  $ق(s) = لوـs$  ، أمثل الاقترانات الآتية في المستوى الديكارتي:

$$أ) هـ(s) = لوـs - 1$$

$$ب) ل(s) = لوـ(s + 2)$$

$$ج) م(s) = -لوـ(s + 1)$$

(٢) أجد مجال كل من الاقترانات الآتية:

$$أ) ق(s) = لوـ(٥s - s^٥)$$

$$ب) ق(s) = لوـ\sqrt{s^2 - 3}$$


## الارتباط الخطي (Linear Correlation)

(٤)

قام قيس بجمع بيانات حول أطوال مجموعة من طلبة الصف العاشر، وكُتُلهم، فكانت كما في الجدول الآتي:



الطول بالسنتيمتر	الكتلة بالكيلوغرام
١٥٨	٥٦
١٦٧	٦٨
١٥٠	٥٥
١٦٢	٦٠
١٥٥	٥٨
١٦٠	٦٠
١٦٥	٦٢
١٦٠	٦٥
١٧٠	٧٠



أمثلُ شكل الانتشار لهذه البيانات:

- هل توجد علاقة بين طول الإنسان وكتلته؟
- هل يمكن رسم مستقيم يمر بمعظم النقاط؟

أتعلمُ: إذا أمكن رسم مستقيم يمر بمعظم النقاط في شكل الانتشار، فإن العلاقة بين المتغيرين خطية، وتسمى هذه العلاقة الارتباط الخطي.

- هل بالإمكان تحديد قيمة عددية لقوة الارتباط بين المتغيرين؟

**أستنتج:** شكل الانتشار يفيد في تحديد ما إذا كانت هناك علاقة، ونوعها خطية، أو غير خطية بين متغيرين، ولكن لا يكفي للحكم على قوة الارتباط بين المتغيرين؛ لأن تقديره يختلف باختلاف الشخص الذي يقوم بالحكم على قوة الارتباط؛ ولذلك يجب استخدام طريقة أكثر دقة، يتم بواسطتها تحديد قيمة عددية لقوة الارتباط بين المتغيرين، وهي ما يسمى معامل الارتباط، وهذا ما سيتم تعلمه في الدرس القادم.

## تمارين ومسائل:

- ١) يمثلُ الجدولُ الآتي علاماتِ مجموعَةٍ من الطلبة في مبحثيّ الفيزياء (س)، والكيمياء (ص).  
أرسمُ شكل الانتشار، وأبيّنُ نوع الارتباط.

٤	٢	١١	١٠	١٢	٨	٩	٥	س
٦	٤	١٣	٩	١٥	٨	١٠	٧	ص

- ٢) في الجدول الآتي أعمارُ مجموعَةٍ من الأشخاص (س)، وعدد الساعات اليومية التي يمارسون فيها التمارين الرياضية (ص):

٦٠	٥٥	٥٠	٤٠	٣٥	٢٠	٢٢	٢٥	٣٠	س
١	٢	٣,٥	٥	٤	١	١,٥	٢	٣	ص

- أرسمُ شكل الانتشار لهذه البيانات.
- هل يوجد ارتباطٌ خطٌّ بين عمر الشخص وعدد الساعات اليومية التي يقضيها في ممارسة التمارين الرياضية؟

( ٥ )

## معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)

**تعريف:** إذا كانت  $S$  ،  $ص$  مجموعتين من القيم المتناظرة فيعرفُ معامل ارتباط بيرسون  $r$  كما يأتي:

$$r = \frac{\sum_{k=1}^n (S_k - \bar{S})(ص_k - \bar{ص})}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (S_k - \bar{S})^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n (ص_k - \bar{ص})^2}}$$

حيث:  $\bar{S}$  الوسط الحسابي لمجموعة قيم  $S$  ،  $\bar{ص}$  الوسط الحسابي لمجموعة قيم  $ص$  ،  $n$  عدد القيم.

خالدُ ورفاقُهُ في الصف العاشر، يعيشون في حيِّ الياسمينة في نابلس، استلموا علاماتِهم المدرسية، بعد اختباراتِ الشهرين، فأرادوا دراسةَ العلاقةِ بين علاماتِهم في مبحثيِّ اللغة العربية واللغةِ الإنجليزية، من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون.

١  
نشاط

٣٠	١٥	٢٠	٢٥	٢٠	اللغة العربية س
٣٠	٢٠	١٨	٢٢	٢٥	اللغة الانجليزية ص

أكمل الجدول الآتي

س ص	ص <sup>٢</sup>	س <sup>٢</sup>	ص	س	
			٢٥	٢٠	
	٤٨٤		٢٢	٢٥	
		٤٠٠	١٨	٢٠	
			٢٠	١٥	
٩٠٠			٣٠	٣٠	
	٢٧٣٣		١١٥	١١٠	المجموع

$$\dots = \sum_{k=1}^n s^k c^k$$

$$\dots = \sum_{k=1}^n c^k s^k$$

$$\dots = \sum_{k=1}^n s^k c^k$$

• أحسب:

$$\dots = \overline{c} \quad \dots = \overline{s}$$

• أحسب معامل ارتباط بيرسون:

$$\frac{23 \times 22 \times 5 - 2610}{\sqrt{(23) \times 5 - 2733} \sqrt{(22) \times 5 - 2550}} = \checkmark$$

$$\dots = \checkmark$$

أتعلم: ١ -  $r \geq 1$

## تمارين وسائل:

١) حسب ثأر معدّل درجات الحرارة في قريته، في الأسابيع الثمانية من شهري كانون أول و كانون ثاني، وعدّ أسطوانات الغاز التي تستهلكُها أسرته للتدافئة في كلّ أسبوع، فكانت على النحو الآتي:

درجة الحرارة س	٨	١٠	٢٠	٠	١٢	٨	٥	١٠
عدد أسطوانات الغاز ص	٢	١	٣	٢	١	٢	٢	٣

أحسب معامل ارتباط بيرسون.

٢) قام طلبة الصف العاشر الأساسي في مدرسة المجدل الثانوية، بدراسة العلاقة بين عدد أفراد الأسرة لدى طلبة الصف، وكمية استهلاك الماء شهرياً، فجمعوا البيانات، وحصلوا على النتائج الآتية، علماً بأنّ عدد الأسر خمس. أحسب معامل ارتباط بيرسون.

$$\sum_{k=1}^n s = 20$$

$$\sum_{k=1}^n c = 110$$

$$\sum_{k=1}^n sc = 490$$

$$\sum_{k=1}^n s^2 = 90$$

$$\sum_{k=1}^n c^2 = 2700$$

## مهمة تقويمية:

- أحسب معامل ارتباط بيرسون للبيانات في الجدول الآتي:

١٥	٦	١٦	٥	٨	١٠	س
١٢	٦	١٥	٥	٧	٩	ص

## معامل ارتباط سبيرمان (Spearman Correlation Coefficient)

(٦)

قام معلم الصف الثالث الأساسي في مدرسة فلسطين الأساسية بدراسة العلاقة بين تقديرات مبحثي اللغة العربية والرياضيات، لأربعة طلاب، ودون النتائج في الجدول الآتي:



اسم الطالب	سعيد	أيمن	ناجح	شادي
اللغة العربية س	جيد	ضعيف	ممتاز	مقبول
الرياضيات ص	مقبول	جيد	جيد جداً	ضعيف

- أراد المعلم أن يُحدّد العلاقة بين تحصيل الطلبة في مبحثي اللغة العربية والرياضيات، وإيجاد معامل ارتباط بينهما، فهل يستطيع إيجاد معامل ارتباط يبررسون لهذه البيانات؟ لماذا؟
- أُبّرّ عن البيانات الوصفية بقييم عدديّ، بإعطاء رتب للطلبة في المبحثين.

أكمل الجدول الآتي:

اسم الطالب	سعيد	أيمن	ناجح	شادي
اللغة العربية س	...	الرابع	الأول	الثالث
الرياضيات ص	الثالث	...	...	...

تعريف: يُعرّف معامل ارتباط سبيرمان بين متغيرين، ويُرمز له بالرّمز  $r_s$  حسب القانون:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

ف: الفرق بين رتب المتغير س والمتغير ص.

ن: عدد قيم كلّ من المتغيرين.

**ملاحظة:** إذا تساوت الرتب نأخذ الوسط الحسابي لرتب القيم المكررة.

$$\dots = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} - 1 = \sigma$$

أحسب معامل ارتباط سبيرمان للبيانات في الجدول الآتي:

٩٠	٦٥	٥٥	٧٥	٦٥	٨٥	٧٠	٦٥	٨٠	٦٠	س
٩٠	٦٥	٧٥	٨٠	٦٠	٧٠	٩٠	٧٠	٦٠	٧٠	ص



أكمل الجدول الآتي:

ف <sup>٢</sup>	ف	رتب ص	رتب س	ص	س
	٣	٦	٩	٧٠	٦٠
				٦٠	٨٠
			٧	٧٠	٦٥
		١٠٥		٩٠	٧٠
	٤-		٢	٧٠	٨٥
				٦٠	٦٥
		٣		٨٠	٧٥
				٧٥	٥٥
				٦٥	٦٥
٠,٢٥			١	٩٠	٩٠

$$\dots = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} - 1 = \sigma$$

## تمارين وسائل:

١) يُمثلُ الجدولُ الآتي الدخلَ الشهريَّ (س) لستِ أُسرٍ فلسطينيَّة، ومجموعَ نفقاتِها الشهريَّة (ص)، بالدينارِ الأردنيِّ:

٥٥٠	٦٥٠	٤٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٦٠٠	س
٤٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٧٠٠	٧٥٠	٥٥٠	ص

أحسبُ معاملَ ارتباطِ الرتبِ (سبيرمان).

٢) إذا علمتُ أنَّ مجموعَ مربعاتِ فرقِ الرتبِ بين متغيريِّ الطولِ والكتلةِ لدى عينةٍ من تسعهِ أطفالٍ، يساوي ٢١ ، أحسبُ معاملَ ارتباطِ سبيرمان.

## مهمة تقويمية:

- يُمثلُ الجدولُ الآتي تقديراتِ مجموعةٍ من طلبةِ الصفِّ الثاني، في الفصلينِ الأول والثاني:

ج	د	م	ب	م	ج	ب	م	تقدير الفصل الأول
د	ج	ج	ج	م	ب	ب	ب	تقدير الفصل الثاني

أحسبُ معاملَ ارتباطِ سبيرمان.

## الانحدار الخطّي البسيط (Simple Linear Regression)

(٧)

تعريف:

تسمى المعادلة  $\hat{y} = a + b$  التي تربط بين قيم المتغيرين  $x$  ،  $y$  معادلة خط انحدار  $y$  على  $x$

$$b = \frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y})}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} \quad \text{و} \quad a = \bar{y} - b \bar{x}$$

$\bar{x}$  الوسط الحسابي لقيمة المتغير  $x$

$\bar{y}$  الوسط الحسابي لقيمة المتغير  $y$

أحسب كلاً من:  $\bar{x}$  ،  $\bar{y}$  للبيانات في الجدول الآتي:

٥	٢-	٨	٦	٣	$x$
٤-	٦	.	١	٧	$y$

$$\dots = \bar{x} = \dots , \bar{y} = \dots$$



أكمل الجدول الآتي:

س ص	س <sup>٢</sup>	ص	س
٢١		٧	٣
	٣٦	١	٦
		.	٨
		٦	٢-
٢٠-	٢٥	٤-	٥

أجد معادلة خط الانحدار:  $\hat{y} = a + bx$

أحسب: قيمة  $a = \dots \dots \dots$  ، وقيمة  $b = \dots \dots \dots$

معادلة خط الانحدار:  $\hat{y} = \dots \dots \dots + \dots \dots \dots$

أتعلم: يمكن استخدام معادلة الانحدار في حساب قيم ص إذا علِمت قيم س.

## تمارين ومسائل:

- يُمثلُ الجدولُ الآتي عددَ ساعاتِ الدراسةِ اليوميّة، ومعدّلَ الثانويّةِ العامّةِ، لدى مجموعٍ من الطلبة:

٣	٥	٦	٤	٢	عدد ساعات الدراسة س
٧٠	٧٠	٨٠	٧٠	٦٠	معدل الثانوية العامة ص

- أجُدُّ معايَلَةً خطًّا انحدارِ ص على س.
- إذا درس طالب ٨ ساعات يوميًّا، فكم تتوقع المعدل الذي سيحصل عليه؟

## مهمة تقويمية:

- اعتمادًأ على البيانات في الجدول الآتي، أجُدُّ معايَلَةً خطًّا انحدارِ ص على س :

٧	١١	٩	٧	٥	٣	س
٦	١٢	١١	٧	١٠	٨	ص

(٨)

## مبدأ العد (Counting Principle)

مبدأ العد الأساسي:

إذا أمكننا إجراء عملية ما على خطوات عددها  $k$ ، بحيث تتم الأولى بطرق عددها  $n_1$ ، وتنتمي الثانية بطرق عددها  $n_2$ ، وهكذا حتى الخطوة الأخيرة التي تتم بطرق عددها  $n_k$ ، فإن عدد الطرق الكلية التي تتم بها هذه العملية هي:  $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ .

يراد تكوين مجلس إدارة لشركة ما، مكون من رئيس، ونائب رئيس، وأمين للصندوق، بكم طريقة يمكن تكوين هذا المجلس، إذا كان عدد الأشخاص المرشحين ٥ ؟  
لاختيار الرئيس، هناك ٥ طرق مختلفه.  
لاختيار نائب الرئيس، هناك .... طرق مختلفه، لماذا ؟  
لاختيار أمين الصندوق، هناك .... طرق مختلفه.  
عدد الطرق المختلفة لتكوين المجلس = ...  $\times \dots \times 3 = \dots$  طريقة مختلفة.



كم عددًا مكونًا من منزلتين، يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام: {٣، ٦، ٥، ٨} ؟  
أ) إذا سمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.



تتم العملية في مرحلتين: المرحلة الأولى اختيار منزلة الآحاد، وتنتمي بـ ... طرق، واختيار منزلة العشرات، وتنتمي أيضًا بـ ... طرق. إذن عدد الطرق الكلية = ...  $\times \dots \times 16 = 16$  طريقة.  
ب) إذا لم يسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

عدد طرق اختيار منزلة الآحاد ... طرق، وعدد طرق اختيار منزلة العشرات ... طرق.  
عدد الطرق المختلفة = ...  $\times \dots \times 12 = 12$  طريقة، أي أنّ: عدد الأعداد المختلفة ١٢ عددًا.

مضروب العدد:

بكم طريقة مختلفة يمكن لخمسة أشخاص أن يجلسوا في خمسة أماكن في خط مستقيم؟  
حسب مبدأ العد: عدد الطرق المختلفة هي  $5 \times \dots \times \dots \times \dots = 120$  طريقة مختلفة.

اصطُلحَ على كتابة حاصلِ الضرب  $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$  على الصورة  $5!$  ، وُتُقرأً مضروب العدد  $5$ .

**تعريف:** إذا كان له عدداً صحيحاً موجباً، فإنّ مضروب العدد له، ويُرمزُ له بالرمز  $!n$ !

حيث:  $!n = n! = n(n-1) \dots (2)(1)$

أحسب قيمةَ كُلّ ممّا يأتي:

$$!6 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = \dots$$



$$!5 = \dots = \frac{!3 \times 4 \times 5}{!3} = \frac{!5}{!3}$$

$$\frac{!5 \times 6 \times 7 \times 8}{1 \times 2 \times 3 \times !5} = \frac{!8}{!3 !5}$$



أكتب  $\frac{!8}{!2 - n}$  في أبسط صورة.

$$\dots = \frac{!(2-n)(1-n)n}{!(2-n)} = \frac{!n}{!(2-n)}$$

قيمةُ المقدار، عندما  $n = 5$  تساوي .....

## تمارين ومسائل:

١) يقدم أحد المطاعم في مدينة نايلس ٣ أنواع من اللحوم، و ٤ أنواع من الحلوي، ونوعين من المشروبات. بكم طريقة يمكن لأحد مرتادي المطعم اختيار وجبة مكونة من نوع من اللحوم، ونوع من الحلوي، ومشروب؟

٢) أقيمت قطعة نقد ٣ مرات، فما عدد النتائج الممكّنة؟ أكتب النتائج في مجموعة.

٣) كم عدداً مؤلّفاً من ثلاثة منازل، يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام: { ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ }؟

أ) إذا سُمِحَ بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

ب) إذا لم يُسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.

## التباديل (Permutations)

(٩)

تعريف:

التباديل: عدد الترتيب المختلفة لمجموعة من العناصر مأخوذة كلها أو جزء منها في كل مرة  
عدد تباديل  $n$  من العناصر مأخوذة جميعاً في كل مرة، هو  $n!$ ، ويُرمز له بالرموز  $(n, n)$ ،  
حيث  $n \in \mathbb{N}^+$

$$L(n, n) = n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n$$

أجد قيمة:  $L(6, 6)$ .

$$L(6, 6) = 6 \times \dots \times \dots \times \dots \times 1 = 720$$

ماذا نلاحظ؟ ..... =  $L(5, 5)$



أجد عدد الأعداد المكونة من منزلتين، التي يمكن تكوينها من مجموعة الأرقام:  
 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$  ، إذا لم يسمح بتكرار الرقم في أكثر من منزلة.



الاحظ أن المطلوب هو عدد الترتيبات الثنائية لمجموعة الأرقام هذه، بشرط عدم التكرار،  
ويساوي ..... = .....  
ويساوي ..... = .....

وهذا ما يسمى التباديل الثنائية لمجموعة فيها 5 عناصر، وبشكل عام، فإن عدد التباديل الرائية  
لمجموعة مكونة من  $n$  من العناصر، ويُرمز له بالرموز  $(n, r)$ ،

$$\text{يساوي } \frac{!n}{!(n-r)}$$

حيث  $n \geq r$  ،  $r$  عددان طبيعيان،  $n \geq r$

أجد قيمة كل مما يأتي:

$$\text{أ) } L(5, 3) = \frac{!5}{!(5-3)} = \dots$$



$$\text{ب) } L(3, 3) = \frac{!3}{!(3-3)} = \dots$$

أتعلّم: يمكن كتابة  $L(n, r)$  على الشكل:  $L(n-1)(n-2)(n-3) \dots (n-r+1)$ .

أتحقّقُ ممّا يأتي:

$$n = \dots = \frac{!n}{!(1-n)} = (1, n, \dots, n-1)$$

$$1 = \dots = (0, 1, \dots, n-1)$$

$$!n = \dots = L(n, n)$$



بكم طريقةً يمكن تشكيل لجنةٍ مكوّنةٍ من رئيسٍ، ونائبٍ رئيسٍ، وأمينٍ سرٍّ من بين سبعة أشخاص؟

عدد الطرق التي يمكن تشكيل اللجنة بها هي:

$$L(3, 7) = \dots \times \dots \times \dots = 210 \text{ طرقٍ مختلفٌ.}$$



## تمارين وسائل:

1) أحسب قيمةً ما يأتي:

$$\frac{L(2, 9)}{L(0, 90)} \quad \text{ب) } L(4, 6) \quad \text{أ) } L(2, 9)$$

2) أرادَ أَحْمَدُ وَإِخْوَانُهُ الْثَلَاثَةُ الْذَهَابَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصِيِّ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ كُلُّهُمْ مِنْ بَابٍ مُخْتَلِفٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ السَّبْعَةِ. بكم طريقةً مختلفٍ يمكن للإخوة الأربعة الوصول إلى المسجد الأقصى؟

3) أجد قيمةً له في كُلِّ ممّا يأتي:

$$6 = (2, 3, 2) = 56 \quad \text{ب) } L(n-2, n) \quad \text{أ) } L(n, n)$$

## مهمة تقويمية:

أعُبُّرُ عن كُلِّ ممّا يأتي بالصورة  $L(n, r)$ :

$$A) 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \quad B) 2520 \quad C) L(7-2, 7)$$

## التوافق (Combinations)

(١٠)

تعريف: عدد المجموعات الجزئية التي عناصرها  $n$  مأخوذة من مجموعة عناصرها  $N$  عدد التوافق الرأسي لمجموعة فيها  $n$  من العناصر، ويرمز له بالرمز:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad n \leq N$$

لدى معرض سيارات ٦ أنواع من السيارات، يريدهُ صاحب المعرض اختيار ٤ منها، لعرضها للزبائن.  
أجدُ عدد الطرق التي يمكنُ بها الاختيار.



بما أنّ إعادة الترتيب لا تعطي نتيجة جديدة، أي أنّ الترتيب غير مهم.

$$\text{إذن: عدد الطرق يساوي} = \frac{6 \times 5 \times 4}{4!2!} = \binom{6}{4} = 15$$

$$\text{أتعلم: } 1 = \binom{n}{n} \quad 1 = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r}$$

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r} \quad \text{ج) } n = \binom{n}{1}$$

### تمارين ومسائل:

$$\binom{75}{1} \quad \text{ج) } \quad \binom{9}{4} \quad \text{ب) } \quad \binom{9}{0} \quad \text{أ) } \quad \text{أحسب ما يأتي: أ)}$$

$$\binom{n}{4} = \binom{n}{9} \quad \text{ب) } \quad 3 = \binom{n}{2} \quad \text{أ) } \quad \text{أجدُ قيمَ } n \text{ في كلٍ من الحالات الآتية: أ)}$$

### مهمة تقويمية:

- أ) بكم طريقةٍ يمكنُ تكوينُ فريقٍ لكرةِ السّلة، يتمُ اختيارُه من بين ثمانية لاعبين؟
- ب) صفتُ مكونٌ من ٩ طلابٍ، و٧ طالباتٍ، يرادُ تشكيلُ لجنةٍ مكونةٍ من ٣ طلابٍ، و٤ طالباتٍ، بكم طريقةٍ مختلفةٍ يمكنُ تشكيلُ اللجنة؟

( ١١ )

## نظرية ذات الحدين (Binomial Theorem)

نظرية ذات الحدين:

$${}^n \mathfrak{P} \binom{n}{r} \sum_{r=0}^n = {}^n \mathfrak{P} (a + b)$$

$${}^n \mathfrak{P} \binom{n}{n} + \dots + {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{2} + {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{1} + {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{0} =$$

حيث  $n$  عدد طبيعياً

أجد مفكوك:  $(s + 2)^n$

$$(s + 2)^n = \sum_{r=0}^n {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{r} s^{n-r} 2^r$$



$$s^3 + 3s^2 \times 2 + 3s \times 2^2 + 2^3 = s^3 + 6s^2 + 12s + 8$$

..... =

استنتج:

• عدد حدود مفكوك  $(a + b)^n = \dots \dots \dots$

• مجموع  $n + 1$  حدود في أي حد من حدود المفكوك = .....

أتعلّم:

• في مفكوك  $(a + b)^n = {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{0} a^n + {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{r} a^{n-r} b^r + \dots + {}^n \mathfrak{P} \binom{n}{n} b^n$

• في الحد الأول: قيمة  $r$  تساوي 0 ، وفي الحد الثاني: قيمة  $r$  تساوي 1 ، وهكذا ..  
أي:  ${}^n \mathfrak{P} \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$  ، وهذه صورة الحد العام.



نشاط

في مفهوك  $(2s + \frac{1}{2})$ ، أجدُ الحدَّ الثالث .

في الحد الثالث تكون قيمةُ  $s = 2$

$$\dots = \frac{1}{4} (2(2s)^3) = \frac{1}{4} (2 \times 16 \times 15) = \frac{1}{4} (2 \times 16 \times 16) = 2$$



نشاط

أجدُ الحدَّ الأوسطَ في مفهوك:  $(\frac{2}{3}s + 3)$

بما أنَّ  $s = 8$  ، إذن: عدد الحدود يساوي 8

رتبةُ الحدَّ الأوسطِ هي:  $5 = 1 + \frac{8}{2}$

$$\dots = \frac{1}{4} (3(\frac{2}{3}s)^8) = \dots = 16s^8 = \dots$$

## تمارين وسائل

(١) أجدُ مفهوكَ كُلَّ ممَّا يأتي:

أ)  $(s + 3)^6$

ب)  $(\frac{s}{3} + \frac{3}{s})^6$

ج)  $(2 - s)^{10}$

&lt;/div

## نموذج اختبار ذاتي

السؤال الأول: اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي :

١) أحد الاقترانات الآتية اقتران أسي:

د)  $(\frac{1}{2})^x$

ج)  $(3-x)^x$

ب)  $x^2$

أ)  $(2)^x$

٢) منحنى الاقتران  $Q(x) = (2)^x$ :

ب) متناقص ويمر بالنقطة (١، ٠)

أ) متزايد ويمر بالنقطة (٠، ١)

د) متناقص ويمر بالنقطة (٠، ٢)

ج) متزايد ويمر بالنقطة (٢، ٠)

٣) إذا كان  $n! = 24$  فإن  $24 = 2^n (2n, 3)$

٣٣٦

ج) ٤

ب) ٥٠٤

أ) ٢٤

٤) الحد الأوسط في مفكوك  $(2x-1)^7$ :

د) ٢٤٠٠ س٤

ج) ٢٤٠ س٣

ب) ١٦٠٠ س٣

أ) ١٦٠ س٣

السؤال الثاني: أوجد قيمة ما يأتي:

١)  $L = 20 + 10w$

٢)  $[ \overline{27} - 1 ]$

٣)  $L = \binom{7}{4} + \binom{7}{3}$

السؤال الثالث: إذا كان مجموع مربعات فرق الرتب للمتغيرين (س، ص) لعينة حجمها ٦ يساوي ٢٤ احسب معامل ارتباط سبيرمان موضحاً نوع الارتباط ومدى الارتباط.

## السؤال الرابع:

- أ) بالاعتماد على رسم  $Q(s) = h^s$  ارسم منحنى  $M(s) = -h^s - 3$ ، موضحاً التحويلات الهندسية .
- ب) الجدول الآتي يمثل العلاقة بين المتغيرين  $s$  ،  $ch$  ، بالاعتماد على الجدول أوجد.
- معامل ارتباط بيرسون
  - معادلة خط انحدار  $ch$  على  $s$

				ch	s
				4	1-
				5	2-
				2	1
				1	2
				2-	5

ج) أوجد مفوكوك:  $(\frac{s}{2} + \frac{2}{s})^\circ$

- السؤال الخامس: أ) لديك المجموعة:  $s = \{2, 3, 4, 5, 7\}$  ، كم عدداً زوجياً مؤلفاً من 3 منازل يمكن تكوينه من المجموعة  $s$  إذا لم يسمح بتكرار الرقم؟
- ب) إذا كان  $Q(s) = As + B$  ، وكان منحنى  $Q(s)$  يمر بالنقطة  $(3, 0)$  ، وكان  $A = 15$  ، أوجد قيمة الثوابت  $A$  ،  $B$  .